



Guía y notas del Arroyo de Las Quemadas (Cobeña)



Asociación Arboleda Colaboración SEO Sierra de Guadarrama



Plantas



Chopo blanco (*Populus alba*)



Árbol de ribera, hoja caduca, crecimiento rápido, corteza clara con estrías transversales oscuras.



Hojas simples, lobuladas con envés blanco.

Flores en amentos.

El fruto es una cápsula

Chopo (*Populus nigra*)



Árbol de crecimiento muy rápido, de hoja caduca, y porte variable, desde ahulado a globoso columnar. Suele ser muy derecho en todo caso.



Flores de un solo sexo (foto de masculinas), que brotan a finales de invierno.



El fruto es una cápsula llena de semillas pelosas, que llenan en primavera el ambiente a modo de copos de nieve.

Encina (*Quercus ilex* sbsp. *ballota*)



Árbol de crecimiento muy lento, porte globoso, tronco lleno y recio, raíces muy penetrantes y fuertes, hoja perenne y capacidad de rebrote.

Hojas recias, pinchudas las más accesibles.

El fruto de la encina es una bellota. Es un alimento de primera para multitud de animales

Fresno (*Fraxinus angustifolia*)



Árbol de crecimiento rápido, porte natural ovado. Hojas compuestas de hojuelas en forma de punta de lanza. Floración precoz, y fructificación en otoño.



El fresno está ligado a fondos de vaguada, valles arroyos y ríos. En zonas más húmedas vive también en ladera.



Necesita humedad en el suelo y en el ambiente.

Madera de buena calidad.

Majuelo (*Crataegus monogyna*)



Arbusto espinoso de hojas simples, lobuladas y caducas, flores blancas muy olorosas, y fruto rojo carnoso, que madura en otoño.



Especie que aparece de acompañante en variedad de bosques, apareciendo en vaguadas y zonas de suelo húmedo cuando al hacerse el clima más árido.

Rosal silvestre (Rosa sp.)



Arbusto espinoso, que con el tiempo se transforma en abigarrado; de hoja caduca, compuesta de 5 - 7 hojuelas dentadas, flor de cinco pétalos y olorosa, y fruto carnoso rojo en la madurez: el escaramujo.



Especie indicadora de suelos aún fértiles y profundos.



Los rosales son lugares ideales para albergar nidos y refugios de animales por la protección que ofrecen las espinas.

Retama (Retama sphaerocarpa)



Es la retama una mata abierta, con hojas de duración fugaz, floración tardía (mayo - junio), que produce un fruto en legumbre redonda (el nombre científico indica esta característica) de una semilla (en raras ocasiones dos).

Los retamares son típicos en las etapas de sustitución del encinar.



Aves



*Milano negro (*Milvus migrans*)*



Rapaz de talla media a grande, con alas estrechas, cola larga y levemente ahorquillada. Tonos generales pardo chocolate, con manchas crema en los extremos del ala.

Ratonero común (*Buteo buteo*)



Rapaz de mediano tamaño; aparentemente más corpulenta que los milanos. Cola mediana, redondeada; plumaje muy variable, pero generalmente con borde de fuga del ala oscuro, color claro en la zona central, y borde de ataque marrón. Suelen tener una banda clara en forma de V en la zona pectoral.

Buitre leonado (*Gyps fulvus*)



Inmensa rapaz, con anchas alas bicolor (marrón y negro), cola muy corta. Cabeza relativamente pequeña y con plumón blanco.

Picapinos (*Dendrocopos major*)



Pájaro carpintero bastante conspicuo, de tonos blancos, negros y rojos muy vistosos. Tiene el tamaño de un estornino.

Vuelo ondulante; reclamo muy sonoro, que recuerda al sonido del hipo.

Frecuentemente localizado por los tamborileos que realiza en árboles con resonancia, para marcar su territorio.

Carbonero común (*Parus major*)



Bonito pájaro de tamaño similar al gorrión. Tonos verdosos en el dorso, y amarillos en el vientre. Banda ventral negra, muy marcada en machos, y más difusa en hembras.

Cara negra, con dos grandes manchas blancas laterales.

Especie muy escandalosa, con multitud de reclamos y cantos registrados.

Especie frecuente en zonas arboladas.

Herrerillo común (*Cyanistes caeruleus*)



Pequeña ave forestal, colorida, de llamativos tonos verdosos azulados en el dorso, y amarillentos en el vientre. La banda ventral oscura está poco definida, y la cara es azul, con lista ocular negra, y mancha lateral blanca.

Recuerda al carbonero común, pero notablemente más pequeño.

Especie muy gregaria, siendo habitual encontrarlos en nutridos grupos.

Muy vocinglero.

*Curruca carrasqueña (*Sylvia cantillans*)*



Pequeña ave de matorral y de bosques secos.

Se caracteriza por tener tonos grísáceos en el dorso, y tonos más cálidos (anaranjados, rojizos o ante) en el vientre.

De la base del pico nace una mancha blanca alargada muy visible en los machos.

Los ojos están rodeados de una aureola rojiza.

Especie solitaria, que se mueve por entre el matorral, no tanto en las copas de los árboles.

Pínzón vulgar (*Fringilla coelebs*)



Ave del tamaño de un gorrión, asociado a claros y a bordes de áreas forestales.

Machos de tonos azulados y rojizos, con antifaz oscuro y manchas blancas en la zona dorsal del ala.

Hembras de tonos más apagados y verdosos.
Manchas claras de las alas no tan limpias.

Especie gregaria.

Jilguero (*Carduelis carduelis*)



Pequeña ave canora asociada a lugares abiertos con cardos y otras plantas de abundante semilla.

Ave muy colorida, con predominio de tonos ante, amarillo, negro y rojo.

Cara negra con aureola roja y banda blanca que une los ojos pasando por la garganta.

Especie gregaria que suele unirse a gorriones, pinzones, verdecillos, pardillos, etc.



Notas